

2015年8月  
No.15-118a(山)※5

## 「エストラジオール(E<sub>2</sub>)」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目の委託先より現行試薬の販売中止に伴い、急遽検査内容を変更する旨の連絡がございましたので、取り急ぎお知らせいたします。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象項目/変更内容

項目 コード	検査項目名	変更内容	新	旧
54	エストラジオール (E <sub>2</sub> )	検 体 量	血清 0.5 mL	血清 0.4 mL
		検査方法	CLIA	ECLIA
		基 準 値	裏面の別表をご参照下さい	
		報 告 範 囲	10未満、 10~99900000	10 以下、 11~99900000
54	IVF-エストラジオール (E <sub>2</sub> )	検査方法	CLIA	ECLIA
		報 告 範 囲	10未満、 10~99900000	10 以下、 11~99900000

※その他検査要領に変更はございません。

※新旧二法の相関につきましては、裏面をご参照下さい。

※同一試薬にて測定しておりますIVF-エストラジオール(E<sub>2</sub>)につきましても、併せて検査内容変更いたします。

#### ■変更期日

●2015年8月6日(木)受付分より

以上


## ■エストラジオール(E<sub>2</sub>)基準値 (血中)

【新法】		(単位: pg/mL)			
非 妊 婦	女性	卵胞期	22	～	147
		排卵期	57	～	509
		黄体中期	56	～	321
		月経期	7	～	153
		閉経後	6	～	37
	男性	10	～	40	
妊 婦	妊娠初期	1130	～	29200	
	妊娠中期	1110	～	39700	
	妊娠後期	1760	～	41600	

【旧法】		(単位: pg/mL)				
非 妊 婦	女性	卵胞期	前期	20	～	85
		後期	25	～	350	
		排卵期	50	～	550	
	男性	黄体期	45	～	300	
		閉経後	21以下			
		男性	15	～	35	
妊 婦	10週未満	600	～	3600		
	10～15週	800	～	5500		
	16～20週	3200	～	20000		
	21～25週	8900	～	27000		
	26週～30週	7900	～	35000		
	31週	11000	～	49000		

## ■エストラジオール(E<sub>2</sub>)新旧二法の相関



(SRL 検討データ)

## ■参考文献

岩佐 武:産婦と婦人科 73(1):133～140,2006.